

地点	標高	深度	地点	標高	深度
	m	m		m	m
NO.1	73.000	29.28	NO.10	72.950	26.29
2	73.047	31.27	11	72.980	25.29
3	72.923	29.30	12	72.971	26.20
4	73.466	27.30	13	73.034	25.30
5	72.820	25.32	14	72.993	24.33
6	72.977	28.21	15	72.961	24.30
7	72.985	28.23	16	73.101	25.36
8	73.200	27.35	17	73.050	25.32
9	72.980	27.29			

● 既資料  
● 今回調査地点

図名	調査位置図	縮尺	1:500
件名	(仮称)金井中学校地質調査委託		
場所	町田市金井町275-1		


調査名・調査地点 (坂林)金井中学校地質調査委託

標高 73.000 m

調査年月日 58年2月26日~58年2月27日

ボーリング孔: No. 1

孔内水位 GL-14.60 m



備考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- テニソン型サンプラー
- フォイルサンプラー
- その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託

標高 73.047 m

調査年月日 58年2月23日~58年2月25日

ボーリング孔No. 2

孔内水位 GL-14.70 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験							試料採取					
				土質記号	土質名	色調	記号	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N 値					試料番号	深さ m	採取方法
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40			
1								-1.15	1	0	1									
2								1.70	55	27	28									
3								2.15	2	1	1									
4								2.47	32	18	14									
5	68.05	5.00	5.00	盛土	茶褐			3.15	5	1	2	2								
6	67.35	5.70	0.70	表土(黒朽)	暗茶			3.48	33	10	14	9								
7								4.15	2	1	1									
8								4.48	33	20	13									
9								5.15	3	1	1	1								
10	62.85	10.20	4.50	ローム	茶褐			5.46	31	14	9	8								
11								6.15	3	1	1	1								
12								6.46	31	15	9	7								
13								7.15	5	2	2	1								
14								7.48	33	17	11	5								
15								8.15	7	2	3	2								
16								8.46	31	12	13	6								
17								9.15	2	1	1									
18								9.49	34	20	14									
19								10.15	14	3	5	6								
20								10.45	30	10	10	10								
21								11.15	18	5	6	7								
22								11.45	30	10	10	10								
23								12.15	19	5	7	7								
24								12.45	30	10	10	10								
25								13.15	18	5	6	7								
26								13.45	30	10	10	10								
27								14.15	21	5	7	9								
28								14.45	30	10	10	10								
29								15.15	25	6	8	11								
30								15.45	30	10	10	10								
31								16.15	27	6	9	12								
32								16.45	30	10	10	10								
33								17.15	20	5	8	7								
34								17.45	30	10	10	10								
35								18.15	21	5	6	10								
36								18.45	30	10	10	10								
37								19.15	28	6	10	12								
38								19.45	30	10	10	10								
39								20.15	23	5	7	11								
40								20.45	30	10	10	10								
41								21.15	16	3	6	7								
42								21.45	30	10	10	10								
43	50.35	22.70	12.50	シルト混	細砂	黄茶		22.15	18	4	5	9								
44								22.45	30	10	10	10								
45								23.15	19	4	6	9								
46								23.45	30	10	10	10								
47	48.55	24.50	1.80	シルト	青灰			24.15	46	11	15	20								
48								24.45	30	10	10	10								
49								25.15	28	6	7	15								
50								25.45	30	10	10	10								
51								26.15	50	27	23									
52								26.27	12	10	2									
53								27.15	50	42	8									
54								27.26	11	10	1									
55								28.15	50	28	22									
56								28.29	14	10	4									
57								29.15	50	37	13									
58	43.25	29.80	5.30	固結シルト	青灰			29.27	12	10	2									
59								30.15	50	50										
60								30.23	8	8										
61	41.78	31.27	1.47	細砂	青灰			31.15	50	38	12									
62								31.27	12	10	2									

▽  
14.70m

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託

標高 72.923 m

調査年月日 58年2月27日~58年3月1日

ボーリング孔: No. 3

孔内水位 GL-14.60 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験						試料採取				
				土質記号	土質名	色調	記号	深さ m	貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N 値			試料番号	深さ m	採取方法
1								1.15	4	1	1	1	1					
2								1.49	34	12	8	7	7					
3								2.15	4	1	1	1	1					
4								2.46	31	15	7	5	4					
5	67.82	5.10	5.10		ローム茶褐			3.15	7	2	2	3						
6								3.45	30	10	10	10						
7	66.12	6.80	1.70		粘土質ローム			4.15	4	1	1	1						
8	65.57	7.35	0.55		シルト質細砂	黄	灰	4.26	31	9	7	7	8					
9								5.15	2	1	1							
10								5.48	33	20	13							
11								6.15	3	1	1	1						
12								6.31	36	18	10	8						
13								7.15	12	3	4	5						
14								7.45	30	10	10	10						
15								8.15	15	5	5	5						
16								8.45	30	10	10	10						
17								8.45	30	10	10	10						
18								9.15	18	5	7	6						
19								9.45	30	10	10	10						
20								10.15	21	6	7	8						
21								10.45	30	10	10	10						
22								11.15	22	5	7	10						
23								11.45	30	10	10	10						
24								12.15	29	8	9	12						
25								12.45	30	10	10	10						
26								13.15	22	6	7	9						
27								13.45	30	10	10	10						
28								14.15	22	6	6	10						
29								14.45	30	10	10	10						
30								15.15	24	5	7	12						
31								15.45	30	10	10	10						
32								16.15	25	5	8	12						
33								16.45	30	10	10	10						
34								17.15	24	5	8	11						
35								17.45	30	10	10	10						
36								18.15	26	5	8	13						
37	53.82	19.10	11.75		細砂黄灰			18.45	30	10	10	10						
38								19.15	30	5	10	15						
39								19.45	30	10	10	10						
40	52.32	20.60	1.50		シルト混り細砂			20.15	26	5	8	13						
41								20.45	30	10	10	10						
42								21.15	25	6	7	12						
43	51.22	21.70	1.10		細砂			21.45	30	10	10	10						
44								22.15	17	4	5	8						
45								22.45	30	10	10	10						
46	50.03	22.89	1.19		シルト混り細砂			23.15	40	9	9	22						
47								23.45	30	10	10	10						
48	49.57	23.35	0.46		礫混り細砂			24.15	30	10	10	10						
49								24.45	30	10	10	10						
50								24.15	50	23	27							
51								24.35	20	10	10							
52								25.15	50	24	26							
53								25.32	17	10	7							
54								26.15	50	26	24							
55								26.30	15	10	5							
56								27.15	50	31	19							
57								27.29	14	10	4							
58								28.15	50	30	20							
59	44.42	28.50	5.15		固結シルト	青	灰	28.28	13	10	3							
60								29.15	30	28	22							
61	43.62	29.30	0.80		細砂			29.30	15	10	5							

備考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
- フォイルサンプラー
- その他

調査名・調査地点 (飯林)金井中学校地質調査委託


標高 73.466 m

調査年月日 58年2月25日~58年2月26日

ボーリング孔: No. 4

孔内水位 GL-14.50 m

標高	深さ	層厚	現場観察記録			標準貫入試験					試料採取					
			土質記号	土質名	色調	記号	深さ	打撃回数	10cmごとの打撃回数			N値	試料番号	深さ	採取方法	
72.27	1.20	1.20	X	盛土	茶褐	ロ-ム質土の盛土。火山礫石を含有するロ-ム塊を混る。	1.15	8	2	3	3					
						有機物・スコリアを混る。	1.45	30	10	10	10					
70.67	2.80	1.60		ロ-ム	茶褐	170m以下果やや粘土質を呈する。	2.15	3	1	1	1					
70.17	3.30	0.50		砂質粘土	黄灰	雲母片砕物混る。粘性中微細。	2.47	32	12	10	10					
69.57	3.90	0.60		シルト質細砂	黄灰	風化性砂。雲母片を混る。	3.15	10	3	3	4					
							3.45	30	10	10	10					
							4.15	13	4	4	5					
							4.45	30	10	10	10					
							5.15	16	4	6	6					
							5.45	30	10	10	10					
							6.15	13	3	5	5					
							6.45	30	10	10	10					
							7.15	12	3	5	4					
							7.45	30	10	10	10					
							8.15	14	4	4	6					
							8.45	30	10	10	10					
							9.15	17	4	5	8					
						全般に、やや風化質状を呈し、シルト性をおびている。	9.45	30	10	10	10					
							10.15	23	6	7	10					
							10.45	30	10	10	10					
							11.15	23	6	8	9					
							11.45	30	10	10	10					
						粒子均一。雲母片混入。	12.15	24	7	8	9					
							12.45	30	10	10	10					
							13.15	27	6	8	13					
							13.45	30	10	10	10					
							14.15	28	7	10	11					
							14.45	30	10	10	10					
							15.15	28	6	9	13					
							15.45	30	10	10	10					
							16.15	28	7	9	12					
							16.45	30	10	10	10					
							17.15	30	6	10	14					
							17.45	30	10	10	10					
							18.15	36	7	10	19					
							18.45	30	10	10	10					
							19.15	26	5	7	14					
							19.45	30	10	10	10					
							20.15	32	7	12	13					
52.67	20.80	16.90		細砂	黄灰		20.45	30	10	10	10					
52.12	21.35	0.55		硬質シルト	黄灰	全体に火山灰性。	21.15	38	5	10	23					
51.77	21.70	0.35		固結細砂	茶褐灰	腐化物を塊状に持たす。	21.45	30	10	10	10					
						全般に粗粒状の白色軽石を斑点状に点状。	22.15	50	10	14	26					
50.77	22.70	1.00		固結シルト	青灰	腐植物雲母片混入。	22.40	25	10	10	5					
						均一細粒砂。	23.15	50	20	24	6					
50.12	23.35	0.65		細砂	灰褐	雲母片混入。	23.38	23	10	10	3					
						23.70~23.85m間に黄灰の固結シルト挟在。	24.15	50	25	25						
						褐色の腐化物混る。	24.31	16	10	6						
48.32	25.15	1.80		固結砂質シルト	褐灰	24.10~24.15mに黄灰の微砂を挟む。	25.15	50	17	30	3					
						所々5~10cm位の棒状IPと互る。	25.37	22	10	10	2					
46.97	26.50	1.35		固結シルト	青灰	軽石。腐植物。雲母片を混る。	26.15	50	50							
						白色の軽石を、斑点状に混る。	26.23	8	8							
							27.15	50	24	26						
	27.30	0.80		シルト混細砂	青灰		27.30	15	10	5						



備考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
- フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (坂杯)金井中学校地質調査委託


標高 72.820 m

調査年月日 58年2月19日~58年2月21日

ボーリング孔: No 5

孔内水位 GL-12.50 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験						試料採取						
				土質記号	土質名	色調	記号	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N 値		試料番号	採取方法				
								10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60			
1	72.42	0.40	0.40	盛土	灰褐		工事車搬入路の敷砂利 0.90~1.15m間はスコリア 火山シキ軽石等混り半固 結している。 1.15~1.35m間は黄褐 灰色の軽石層と挟む(0.20m)	1.15 1.45 2.15	3 30	1 12	1 14	1 4								
2																				
3							270m附近よりスコリア等 の含有物が少なくなる やや粘性増す。	2.51 3.15	36 35	16 22	10 13	10								
4	69.02	3.80	3.40	ローム	茶褐		全般にやや粘性をおびて あり均一粒子。 黄褐色の酸化物を所々 レンズ状及び不規則に 挟む。	4.15 4.45 5.15	8 30	2 10	3 10	3 10								
5																				
6																				
7	66.02	6.80	3.00	シルト質	細砂	黄灰		6.15 6.45 7.15	12 30	2 10	4 10	6 10								
8							均一細粒砂で雲母片を 混る。	7.45 8.15	20 30	5 10	6 10	9 10								
9								8.45 9.15	30	4 10	5 10	9 10								
10								9.45 10.15	28 30	7 10	8 10	13 10								
11							所々極少( $\phi=5\sim6mm$ ) のコアとなる。(棒状)	10.45 11.15	30	5 10	6 10	10 10								
12								11.45 12.15	30	6 10	7 10	7 10								
13	60.02	12.80	6.00	細砂	黄灰			12.45	30	6 10	7 10	10 10								
14	59.52	13.30	0.50	シルト質	細砂	黄褐灰	砂酸化物を挟む。雲母混入。	13.15	26	6 10	9 10	11 10								
15	59.07	13.75	0.45	細砂	黄灰		粒子均一。雲母片混入。	13.45	30	10 10	10 10	10 10								
16							所々棒状コア( $\phi=5\sim10mm$ ) となる。褐色の酸化物を レンズ状に挟む。	14.15 14.45	17 30	5 10	6 10	6 10								
17	57.97	14.85	1.10	シルト質	細砂	黄褐灰		15.15 15.45	19 30	6 10	6 10	7 10								
18							均一粒子。 雲母混る。	16.15 16.45	15 30	4 10	4 10	7 10								
19	54.47	18.35	3.50	細砂	黄灰			17.15 17.45	20 30	5 10	5 10	10 10								
20	53.52	19.30	0.95	シルト混	細砂	褐灰	暗褐色の腐植物 黄褐色の 砂をレンズ状に挟む。 シルトが不規則に挟む。	18.45 19.15	30 39	7 10	11 10	11 10								
21	52.92	19.90	0.60	固結	シルト	青灰	全体に微砂をまみり。5~ 8mm位の棒状コアとなる。 酸化物 軽石 雲母片 有物 を少量混る。	19.45 20.15	30	10 10	10 10	10 10								
22							暗褐色の酸化物をレンズ状 に挟む。	20.43 21.15	28 50	9 10	12 10	29 20								
23	50.09	22.73	2.83	シルト混	細砂	黄灰		21.40 22.15	25 50	10 18	10 32	5								
24							細砂を薄く(2~3mm位)挟 む。雲母片混入。	22.35 23.15	20 50	10 50	10									
25	47.50	25.32	2.59	固結	シルト	青灰	砂分に軽石(細中粒状)を 若干混る。 所々腐植物を混る。 全般に固結しており微砂をま みり。	23.25 24.15 24.35	10 50 20	10 20 10	10 30 10									
26								25.15 25.32	50 17	24 10	26 7									
27																				
28																				
29																				
30																				



備考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
- フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託

標高 72.977 m

調査年月日 58年2月27日~58年3月2日

ボーリング孔: No. 6

孔内水位 GL-12.70 m

標尺m	標高m	深さm	層厚m	現場観察記録	土質記号	土質名	色調	記号	深さm	打撃回数 貫入量cm	10cmごとの打撃回数			N値						試料採取 試料番号	深さm	採取方法
											10cm	20cm	30cm	0	10	20	30	40	50			
1				暗茶褐色のロームで200M附近は粘土質ロームを混入。粘土中量含む。					1.00	0	自沈											
2				300~360M間 固結状の砂を混入。					1.35	55												
3				腐植物混り 粘土分別。					2.00	0												
4				360M位より 粘土質ロームとなり 中砂少量混入。					2.70	70												
5				粘性中位。含水少ない。					3.15	5	1	2	2									
6				スリヤを雲母片状に混入。					3.50	35	8	12	15									
7				腐植物 有機物混入。植物繊維を含む。粘性弱。					4.15	3	1	1	1									
8				凝灰質の中砂・細砂を不規則に混入。(少量) 凝灰質粘土を少量含む。粘性中位。					4.45	30	10	10	10									
9	64.18	8.80	8.80	盛土 暗茶褐色					5.15	3	1	1	1									
10	63.08	9.90	1.10	表土(黒ボク) 黒灰					5.45	30	10	10	10									
11				10.80~13.20Mの所は暗茶灰にて細砂を5~10%位混入。固結状である。					6.15	3	1	1	1									
12				13.20~14.60M間はスリヤを5~10%位含む。					6.45	30	16	8	6									
13				含水中。粘性弱い。					7.15	4	1	1	2									
14	58.38	14.60	4.70	ローム 暗茶褐色					7.47	32	10	10	12									
15				15.45M附近より 含水中。粘性中。以深 含水少。粘性弱い。					8.15	4	1	1	2									
16	56.18	16.80	2.20	シルト混細砂 黄灰					8.48	33	12	8	13									
17				16.10~16.80M間に茶褐色の砂を混入。細砂は固結している。					9.15	3	1	1	1									
18				17.45M附近より 含水中。粘性中。					9.46	31	11	10	10									
19	54.28	18.70	1.90	細砂 黄茶灰					10.15	1	1	1	1									
20				火山灰質粘土を互層状に。5~10cm 間に挟む。					10.46	31	31	31	31									
21				18.45M附近より 含水中。粘性中。					11.15	12	3	4	5									
22	51.38	21.60	2.90	シルト混細砂 乳茶灰					11.45	30	10	10	10									
23				20.15M附近より 含水中。粘性中位。					12.15	10	2	4	4									
24	48.78	24.20	2.60	固結シルト 黄茶灰					12.45	30	10	10	10									
25	48.08	24.90	0.70	細砂 茶灰					13.15	8	2	1	5									
26				21.15M附近より 含水中。粘性中。					13.45	30	15	5	10									
27				22.45M附近より 含水中。粘性中。					14.15	8	2	2	4									
28	44.77	28.21	3.31	固結シルト 暗灰					14.45	30	10	10	10									
29				25.45M附近より 含水中。粘性中。					15.15	9	3	4	2									
30				26.15M附近より 含水中。粘性中。					15.45	30	10	10	10									

備考:

試料採取方法の記号

- シンワールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- テニソン型サンプラー
- ファイルサンプラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託

標高 72.985 m

調査年月日 58年2月25日~58年2月26日

ボーリング孔: No. 7

孔内水位 GL-8.90 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録			標準貫入試験					試料採取				
				土質記号	土質名	色調	深さ m	貫入量 cm	10cmごとの 打撃回数			N 値		試料番号	採取方法	
1																
2																
3	69.39	3.60	3.60		ローム茶褐											
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10					乳黄茶											
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20	52.49	20.50	16.90		細砂黄茶灰											
21	51.59	21.40	0.90		シルト混細砂黄茶灰											
22	50.29	22.70	1.30		硬質シルト黄茶灰											
23	49.09	23.90	1.20		団結シルト暗灰											
24	48.49	24.50	0.60		細砂緑青灰											
25																
26																
27	46.19	26.80	2.30		団結シルト暗灰											
28	44.76	28.23	1.43		細砂緑青灰											
29																
30																

備考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- テニソン型サンプラー
- フォイルサンプラー
- × その他



土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (坂林)金井中学校地質調査委託


標高 73.200 m

調査年月日 58年2月22日~58年2月23日

ボーリング孔: No. 8

孔内水位 GL-13.10 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験										試料採取						
				土質記号	土質名	色調	記号	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの 打撃回数			N 値						試料番号	深さ m	採取方法			
1	72.40	0.80	0.80		盛土	茶褐	ローム層の切土による盛土。	-1.15	10	3	3	4												
2							全体に有機物・スリ ア混入。 200m附近は火山砂 礫(風化礫の2~7mm) を混る。	1.15	30	10	10	10												
3							軽石混りて、半固結化 している。	2.15	7	3	2	2												
4	69.40	3.80	3.00		口 - 口	茶褐	軽石混りて、半固結化 している。	2.46	31	11	10	10												
	68.75	4.45	0.65		粘土質口 - 口	茶褐	やや角シキを混る。粘性 強い。スリや軽石混入。	3.15	5	1	1	1												
	68.40	4.80	0.35		粘土混り細砂		有機物 雲母片混る。	3.46	31	7	9	4	5	6										
5								4.15	2	1	1													
6								4.45	30	20	10													
7							全般に均一な細粒砂 でやや火山灰(風化)状 の砂層である。	5.15	15	4	5	6												
8							雲母片を混る。	5.45	30	10	10	10												
9								6.15	14	3	4	7												
10							ややシルト性をおびて いる。	6.45	30	10	10	10												
11							10~11m附近の間は 湿度が大となる。	7.15	17	4	6	7												
12								7.45	30	10	10	10												
13							全般的に色調の濃淡 の変化もなく、ほぼ均質 である。	8.15	19	5	6	8												
14								8.45	30	10	10	10												
15	58.10	15.10	10.30		細砂	黄灰		9.15	21	5	6	10												
16	57.35	15.85	0.75		シルト混り細砂	褐黄灰	粒子均一。雲母片混る。 粘性土を挟み混る。	9.45	30	10	10	10												
17	55.90	17.30	1.45		シルト質細砂	褐黄灰	所々微砂質で、酸化 物 雲母片を混る。	10.15	26	6	9	11												
18	54.53	18.67	1.37		細砂	黄灰	均一な細粒砂からなり 雲母片を混入。	10.45	30	10	10	10												
19	53.40	19.80	1.13		固結シルト	青灰	全体に雲母片・酸化物 混入。細砂を薄く挟み 植物性スズ状に挟む。	11.15	24	6	8	10												
20	52.40	20.80	1.00		シルト混り細砂	黄褐灰	酸化物をレンズ状に挟む。 均一な細粒砂。 雲母片混入。	11.45	30	10	10	10												
21	51.10	22.10	1.30		砂混り固結シルト	黄褐灰	雲母片 酸化物を混る。 微砂、細砂を所々に 混り、挟む。	12.15	21	5	6	9												
22								12.45	30	10	10	10												
23							所々細砂をレンズ状及 び薄層に挟む。	13.15	19	4	6	9												
24							全般にシルトをおびて。 所々シルトの含有大なる。	13.45	30	10	10	10												
25							雲母片 酸化物混る。 25.85~26.23m間腐植 物 軽石混る。 25.30m附近細砂を 10cm位挟む。	14.15	21	5	6	10												
26	46.97	26.23	4.13		シルト質固結微砂	青灰		14.45	30	10	10	10												
27	46.40	26.80	0.57		固結シルト	褐灰	微細粒砂を所々に混り挟む。	15.15	19	6	6	7												
28	45.85	27.35	0.55		細砂	灰褐	粒子均一。雲母片混入。	15.45	30	10	10	10												
29								16.15	28	8	9	11												
30								16.45	30	10	10	10												



備考:

試料採取方法の記号

- デニソン型サンプラー
- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- ⊖ その他

# 土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託

標 高 72.980 m

調査年月日 58年2月28日~58年3月1日

ボーリング孔: No. 9

孔内水位 GL-8.40 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験						試 料 採 取								
				土質記号	土質名	色調	記 事	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N 値						試料番号	採取方法		
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60			
1							ローム質土の盛土。	-1.15														
2							全体的に軟かく逸水する。	-1.59	44	0	1	1										
3								2.15	2	1	1											
4	68.58	4.40	4.40		盛土	茶 褐		2.28	33	18	15											
5							やや粘性強い。スコリア・有機土を含む。	3.15	4	1	1	2										
6							含水少ない。	3.50	35	12	8	15										
7						茶 褐	700m附近より火山灰を混える。	4.15	6	2	2	2										
8								4.47	32	12	10	10										
9						黄 茶	900m附近にて15cm位火山灰を挟み全体に火山灰を多く含む。	5.15	5	2	1	2										
10							10.00m位軟弱。	5.45	30	15	5	10										
11	61.38	11.60	7.20			ローム 茶 褐	11.00mにてスコリア火山灰を含む。	6.15	6	2	2	2										
12								6.47	32	10	10	12										
13							含水少なく 全体にシルト及び少量の雲母を含む。	7.15	7	2	2	3										
14								7.47	32	10	10	12										
15							15.00m位にてシルトを多く含む。	8.15	9	2	3	4										
16								8.47	32	10	11	11										
17							下部層に従いがい やや粒子荒い。	9.15	5	2	2	1										
18								9.45	30	13	12	5										
19							19.00mにてシルト分少なく 砂状の浮石を薄く挟む。	10.15	1	1												
20								10.53	38	38												
21							21.00mにてシルトを薄く挟む。	11.15	5	1	2	2										
22	50.78	22.20	10.60		シルト混り細砂	黄 茶		11.48	33	14	10	9										
23	50.38	22.60	0.40		シルト	黄 茶	粘性弱く 含水少ない。	12.15	18	4	6	8										
24	49.28	23.70	1.10		細 砂	黄 灰 茶	均質細砂にて幾分シルトを混え 少量の雲母を含む。	12.45	30	10	10	10										
25							全体に砂っぽいシルト 粘性弱く 浮石を混える。	13.15	21	6	7	8										
26							沖マ砂を5~20cm位挟む。	13.45	30	10	10	10										
27	45.69	27.29	3.59		固結シルト	青 灰	25.30mより約40cm位砂を挟む。	14.15	23	6	7	10										
28								14.45	30	10	10	10										
29								15.15	26	6	8	12										
30								15.45	30	10	10	10										

備 考:

試料採取方法の記号

- フェニソク型サンプラー
- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー
- フォイルサンプラー
- × その他

# 土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託


標高 72.950 m

調査年月日 58年2月1日~58年3月3日

ボーリング孔: No. 10

孔内水位 GL-7.15 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験						試料採取				
				土質記号	土質名	色調	記事	深さ m	打撃回数 10cm 20cm 30cm	N 値						試料番号	採取方法	
1							含水少ない。 上部、やや粘性強い。	-1.15	2	1	1							
2							全体にスコリア火山灰を含む。	1.45	30	18	12							
3							3.00m位より有機土・スコリア火山灰を含む。 粘性弱い。	2.15	3	1	1	1						
4							3.00m位より有機土・スコリア火山灰を含む。 粘性弱い。	2.47	32	14	10	8						
5							6.00mにて、20cm位、砂状の火山灰と挟み、又全体に多く含む。 2.00mにて、軟弱で粘性弱い。	3.15	5	1	2	2						
6							8.00m附近にて、ベターとした感じのローム。	3.49	34	10	14	10						
7							粘性弱く軟弱。	4.15	4	2	2							
8							全体にシルトを混入。要母を混入。	4.45	31	18	13							
9	63.65	9.30	9.30		ローム	茶褐	粘性弱く軟弱。	5.15	7	2	2	3						
10							全体にシルトを混入。要母を混入。	5.47	32	11	9	12						
11							含水少ない。	6.15	4	1	1	2						
12							粘性弱い。	6.48	33	13	8	12						
13							シルト混り細砂	7.15	3	1	1	1						
14	59.05	13.90	4.60		シルト混り細砂	乳黄茶	粘性弱い。	7.47	32	13	10	9						
15	58.05	14.90	1.00		砂質シルト	黄茶	全体に砂を混入。 含水少ない。	8.15	1	0	1							
16							含水少ない。	8.45	30	9	21							
17							17.00m附近、シルトを挟み、ややシルトが多い。	9.15	8	2	2	4						
18							19.00mにて、全体にシルトを混入。要母を混入。	9.45	30	11	9	10						
19							均質細砂。	10.15	18	4	6	8						
20							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	10.45	30	10	10	10						
21							要母を含む。	11.15	23	6	8	9						
22							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	11.45	30	10	10	10						
23							要母を含む。	12.15	25	6	7	12						
24							均質細砂。	12.45	30	10	10	10						
25	52.75	20.20	5.30		シルト混り細砂	黄茶	17.00m附近、シルトを挟み、ややシルトが多い。	13.15	15	4	5	6						
26	51.75	21.20	1.00		シルト質細砂	黄茶	19.00mにて、全体にシルトを混入。要母を混入。	13.45	30	10	10	10						
27							均質細砂。	14.15	12	3	4	5						
28							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	14.45	30	10	11	9						
29							要母を含む。	15.15	35	8	12	15						
30							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	15.45	30	10	10	10						
31							要母を含む。	16.15	21	5	7	9						
32							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	16.45	30	10	10	10						
33							要母を含む。	17.15	26	7	8	11						
34							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	17.45	30	10	10	10						
35							要母を含む。	18.15	21	5	7	9						
36							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	18.45	30	10	10	10						
37							要母を含む。	19.15	27	5	10	12						
38							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	19.45	30	10	10	10						
39							要母を含む。	20.15	29	5	8	16						
40							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	20.45	30	10	10	10						
41							要母を含む。	21.15	50	26	24							
42							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	21.31	16	10	6							
43							要母を含む。	22.15	50	33	17							
44							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	22.27	12	10	2							
45							要母を含む。	23.15	50	50								
46							シルトを挟み、幾分シルトを含む。	23.22	7	7								
47							要母を含む。	24.15	50	50								
48	48.25	24.70	3.50		細砂	灰茶	含水少ない。	24.23	8	8								
49							砂、小石状の浮石を混入。砂、ほのシルト。	25.15	50	27	23							
50							砂、2~5cm位砂を挟み、要母を含む。	25.28	13	10	3							
51							要母を含む。	26.15	50	26	24							
52	46.66	26.29	1.59		固結シルト	青灰	多く、解体する。	26.29	14	10	4							



備考:

試料採取方法の記号

- デニソン型サンプラー
- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

# 土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託


標 高 72.980 m

調査年月日 58年 2月 5日 ~ 58年 3月 6日

ボーリング孔: No 11

孔内水位 GL-9.45 m

標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験						試 料 採 取									
				土質記号	土質名	色 調	記 事	深 さ m	打撃 回数 貫入量 cm	10cmごとの 打撃回数			N 値			試料番号	深 さ m	採取方法					
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60				
1							上部に、やや粘性強く、スコリア・火山灰を含む。	1.15	5	2	1	2											
2							含水少ない。	1.48	33	14	6	13											
3							280mより30cm位火山灰と挟み200m位より粘性弱い。	2.15	6	2	2	2											
4							ベターとした感じのロームにて、少量の火山灰を含む。	2.46	31	13	10	8											
5	68.18	4.80	4.80				ローム茶褐	3.15	7	2	2	3											
6							全体的にシルトを含む。	3.46	31	11	9	11											
7							6.00mにて、シルトを挟み礫母を含む。	4.15	5	2	2	1											
8							7.00mにて、全体にシルトを含み礫母を含む。	4.48	33	15	13	5											
9							含水少ない。	5.15	17	4	6	7											
10							11.00m 全体にシルトを混え礫母を含む。	5.45	30	10	10	10											
11							14.00mにて、乳黄色になる。	6.15	18	5	6	7											
12							15.00mにて、シルトを挟み黄茶色。	6.45	30	10	10	10											
13							16.00mにて、粒子粗く、有キ土を含む。	7.15	17	5	6	6											
14	56.48	16.50	11.70				シルト混細砂黄灰	7.45	30	10	10	10											
15							19.80m位より、固結状のシルトを含む。	8.15	23	7	9	7											
16							19.80m位より、固結状のシルトを含む。	8.45	30	10	10	10											
17							19.80m位より、固結状のシルトを含む。	9.15	35	7	13	15											
18							19.80m位より、固結状のシルトを含む。	9.45	30	10	10	10											
19							19.80m位より、固結状のシルトを含む。	10.15	29	7	10	12											
20							19.80m位より、固結状のシルトを含む。	10.45	30	10	10	10											
21	51.88	21.10	4.60				シルト質細砂黄茶	10.75	28	7	11	10											
22							含水少ない。	11.45	30	10	10	10											
23							砂状の浮石を混え、砂、(多い)固結状シルト。	12.15	21	5	7	9											
24							棒状コアにならず、よく解体する。	12.45	30	10	10	10											
25	47.63	25.29	4.19				砂、細砂を薄く挟み、礫母植物を含む。	12.75	19	5	6	8											
26							固結シルト青灰	13.45	34	9	11	14											
27								14.15	30	10	10	10											
28								14.45	30	10	10	10											
29								15.15	17	4	5	8											
30								15.45	30	10	10	10											



備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
- フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙


調査名・調査地点 (坂林)金井中学校地質調査委託

標高 72.971 m

調査年月日 58年3月6日~58年3月8日

ボーリング孔: No. 12

孔内水位 GL-12.50 m



備考:

試料採取方法の記号

- シンワールサンブラー
- 貫入試験用サンブラー

- デニソン型サンブラー
- ⊕ フォイルサンブラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (坂林)金井中学校地質調査委託


標高 73.034 m

調査年月日 58年3月3日~58年3月6日

ボーリング孔: No 13

孔内水位 GL-6.50 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験						試料採取					
				土質記号	土質名	色調	記事	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの 打撃回数			N 値						試料番号
1							粘土質ローム状である。 水分多い。 粘性中位。	1.15	1	1									
2	70.53	2.50	2.50		盛土	暗茶褐	スリア少量含む。	1.49	34	34									
3							凝灰質中砂を少量含む。 腐植物少量混入。	2.15	5	1	2	2							
4							有機物含む。	2.48	33	10	13	10							
5	68.13	4.90	2.40		表土(黒木ク)	黒灰	粘性弱い。含水少ない。	3.15	2	1	1	1							
6								3.48	33	20	13								
7							6.70~7.70mの所 細砂中砂と10~20% 位混入。	4.15	3	1	1	1							
8							7.70~10.80mまで凝灰 質中砂と不規則に5~ 20%位混入。	4.45	30	10	10	10							
9							固結状で軽石と雲母状に 少量含む。	5.15	2	1	1	1							
10							含水少ない。 10.80mより暗茶灰となり 軽石を不規則に混入。 粘性弱い。	5.49	34	23	11								
11						暗灰		6.15	3	1	1	1							
12								6.45	30	10	10	10							
13								7.15	14	4	4	6							
14								7.45	30	10	10	10							
15	58.13	14.90	10.00		ローム	茶褐		7.70	9	3	3	3							
16							凝灰質粘土	8.15	30	11	10	9							
17							砂質シルト	8.45	30	11	10	9							
18							乳茶灰	8.75	11	2	3	6							
19								9.15	31	10	10	11							
20								9.46	31	10	10	11							
21								10.15	19	5	6	8							
22								10.45	30	10	10	10							
23								11.15	7	2	2	3							
24								11.45	30	14	8	8							
25								12.15	3	1	1	1							
26								12.45	30	10	10	10							
27								13.15	6	1	2	3							
28	58.13	14.90	10.00		ローム	茶褐		13.45	30	10	12	8							
29								14.15	7	2	2	3							
30								14.46	31	12	9	10							
31								15.15	8	2	3	3							
32								15.45	30	10	10	10							
33								16.15	12	3	4	5							
34								16.45	30	10	10	10							
35								17.15	24	5	8	11							
36								17.45	30	10	10	10							
37								18.15	28	6	10	12							
38	54.43	18.60	2.10		細砂	暗黄灰	固結状である。	18.45	30	10	10	10							
39								19.15	33	9	9	15							
40								19.45	30	10	10	10							
41								20.15	50	12	25	13							
42								20.38	23	10	10	3							
43								21.15	50	19	31								
44								21.32	17	10	7								
45	51.23	21.80	1.40		固結シルト	黄灰	固結により、非常に堅い。 砂分多い。含水少ない。	22.15	50	16	34								
46								22.35	20	10	10								
47								23.15	30	31	19								
48								23.30	15	10	5								
49								24.15	30	35	15								
50								24.29	14	10	4								
51								25.15	30	21	29								
52	47.73	25.30	2.70		固結シルト	暗灰	含水少ない。	25.30	15	10	5								



備考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
- フォイルサンプラー
- その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託

標高 72.993 m

調査年月日 58年2月25日~58年2月27日

ボーリング孔: No. 14

孔内水位 GL-5.00 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験							試料採取							
				土質記号	土質名	色調	記事	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N 値				試料番号	採取方法				
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60			
1							比較的均質。	1.15	5	1	2	2										
2							全体に 中程度の硬度がある。	1.48	33	10	11	12										
3							浮石 炭化物等混る。	2.15	5	2	1	2										
4							4M 附近 やや軟質となり 含水多い。	2.45	30	10	10	10										
5							5.40~5.50M 間 持に軟質である。	3.15	6	2	2	2										
6								3.49	34	12	12	10										
7	66.09	6.90	6.90		茶 褐			4.15	4	2	1	1										
8							低度の固結状態を示す。	4.46	31	18	7	6										
9							局部的に非常に硬い所がある。	5.15	4	2	1	1										
10	63.09	9.90	3.00		暗 灰		浮石混じる。	5.45	30	15	6	9										
11							中砂 極少量含む。	6.15	7	2	3	2										
12							均質。	6.45	30	10	12	8										
13							粘性弱い。	7.15	19	6	6	7										
14							浮石 炭化物等少量含む。	7.45	30	10	10	10										
15							11.05~11.30M 間 浮石層(黄)を挟む。	8.15	14	4	5	5										
16	59.54	13.45	3.55		暗茶褐			8.46	31	11	10	10										
17							全体にシルトを多量に含む。	9.15	11	2	4	5										
18							粒子均一。	9.46	31	10	10	11										
19							15M 附近より やや均質。シルトを全体に含む。	10.15	11	3	4	4										
20								10.45	30	13	8	9										
21							17.20~17.30M 間 固結シルトを挟む。	11.15	5	1	2	2										
22							シルトの薄層(1~5cm)挟む。	11.47	32	10	14	8										
23	54.19	18.80	5.35		シル質細砂 黄 灰		18M 附近より 粘土の薄層みられる。	12.15	4	1	2	1										
24								12.47	32	10	17	5										
25							粒子均一。極度のしり。中砂点在。	13.15	4	2	1	1										
26							全体の少量のシルト挟む。	13.45	30	18	9	3										
27	53.09	19.90	1.10		細 砂 暗黄 灰			14.15	10	3	3	4										
28							重いもので 棒状及び短柱状コアにて採取。	14.45	30	11	9	10										
29							糸状の薄層(10cm位)を挟み 互層状を呈す。	15.15	20	6	7	7										
30								15.45	30	10	10	10										
31							φ=10~15cm	16.15	22	7	7	8										
32								16.45	30	11	9	10										
33							23.55M 附近より 浮石多混る。	17.15	39	14	10	15										
34								17.45	30	10	10	10										
35								18.15	34	8	13	13										
36								18.45	30	10	10	10										
37								19.15	50	14	20	16										
38								19.41	26	10	10	6										
39								20.15	50	14	30	6										
40								20.36	21	10	10	1										
41								21.15	50	18	32											
42	51.64	21.35	1.45		固結シルト 黄 灰			21.35	20	10	10											
43								22.15	50	21	29											
44								22.33	18	10	8											
45								23.15	50	20	30											
46								23.34	19	10	9											
47	48.66	24.33	2.63		固結シルト 暗 灰			24.15	50	23	27											
48								24.33	18	10	8											

備考:

試料採取方法の記号

- デニソン型サンプラー
- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー
- ファイルサンプラー
- × その他

調査名・調査地点 (仮称)金井中学校地質調査委託

標高 72.961 m

調査年月日 58年2月28日~58年3月1日

ボーリング孔No. 15

孔内水位 GL-3.10 m

標尺m	標高m	深さm	層厚m	現場観察記録				標準貫入試験						試料採取						
				土質記号	土質名	色調	記述	深さm	打撃回数 貫入量cm	10cmごとの打撃回数			N値						試料番号	採取方法
											0	10	20	30	40	50	60			
1						茶 褐	多孔質 均質 160m 附近より粘 性弱い。又軟くなる。 浮石炭化物等を混る。 スコリア(赤褐色)を混 る。	-1.15	9	2	3	4								
2						茶 褐	3.65m 附近より所々 固結している。	1.45	30	10	10	10								
3						茶 褐	4.75m 附近より硬い ものとなり、全体に固結 程度が低い。 多孔質である。 5.85~7.25mの間 粘性弱い。	2.15	4	1	1	2								
4						暗茶 褐	9.00m 附近より、火山灰 多く混る。	2.48	33	10	10	13								
5						黄茶 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	3.15	4	1	1	2								
6						淡茶 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	3.49	34	10	12	12								
7						淡黄 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	4.15	5	2	1	2								
8						淡黄 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	4.49	34	17	7	10								
9						淡黄 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	5.15	8	2	3	3								
10						淡黄 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	5.45	30	10	10	10								
11						淡黄 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	6.15	8	3	2	3								
12	60.46	12.50	12.50		ロ-4	淡黄 褐	10.25~10.50m 間 浮石層(黄色)を挟む。	6.46	31	14	7	10								
13	59.66	13.30	0.80		粘土質シルト	暗黄 灰	11.15	6	2	2	2									
14						黄 褐	11.48	33	13	10	10									
15						黄 褐	12.15	7	2	2	3									
16	56.46	16.50	3.20		シルト質細砂	淡黄 灰	12.45	30	10	10	10									
17						淡黄 灰	13.15	10	3	3	4									
18						淡黄 灰	13.45	30	11	9	10									
19						淡黄 灰	14.15	18	5	6	7									
20						淡黄 灰	14.45	30	10	10	10									
21	55.21	17.75	1.25		硬質シルト	淡黄 灰	14.75	17	4	6	7									
22						淡黄 灰	15.45	30	10	10	10									
23	54.36	18.60	0.85		細砂	暗黄 灰	16.15	14	4	4	6									
24						暗黄 灰	16.45	30	10	10	10									
25						暗黄 灰	17.15	22	6	7	9									
26						暗黄 灰	17.45	30	10	10	10									
27						暗黄 灰	18.15	46	14	15	17									
28						暗黄 灰	18.45	30	10	10	10									
29	53.51	19.45	0.85		固結シルト	暗黄 灰	19.15	50	23	27										
30						暗黄 灰	19.32	17	10	7										
31						暗黄 灰	20.15	50	23	27										
32						暗黄 灰	20.33	18	10	8										
33						暗黄 灰	21.15	50	20	30										
34						暗黄 灰	21.35	20	10	10										
35						暗黄 灰	22.15	50	17	24	9									
36						暗黄 灰	22.37	22	10	10	2									
37						暗黄 灰	23.15	50	17	33										
38						暗黄 灰	23.34	19	10	9										
39	48.86	24.10	3.30		固結シルト	暗黄 灰	23.54	50	20	30										
40						暗黄 灰	24.15	50	20	30										
41						暗黄 灰	24.30	15	10	5										

備考:

試料採取方法の記号

- デニソン型サンブラー
- シンウォールサンブラー
- 貫入試験用サンブラー

- ⊕ フォイルサンブラー
- ⊗ その他



# 土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (坂林)金井中学校地質調査委託


標 高 73.101 m

調査年月日 58年 2月25日～58年 2月27日

ボーリング孔：No. 16

孔内水位 GL-6.80 m

標 尺 m	標 高 m	深 度 m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験							試 料 採 取						
				土質記号	土質名	色 調	記 事	深 度 m	打撃 回数 / 貫入量 cm	10cmごとの 打撃回数			N 値						試料番号	深 さ m	採 取 方 法
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50			
1							腐植物少量混る。	1.15	5	1	2	2									
2	70.50	2.60	2.60	ロ-ロ	黄茶褐		所々固結している。	1.48 2.15	33	10	10	13									
3							腐植物・浮石・火山灰少量混る。	3.15	12	4	4	4									
4	68.60	4.50	1.90	固結ロ-ロ	茶 褐		腐植物・火山灰少量混る。 コア状にて採取。	3.46 4.15	31	10	11	10									
5							450~490M間腐泥土挟む。	4.45	30	10	10	10									
6							腐植物・浮石少量混る。	5.15	5	1	2	2									
7	66.40	6.70	2.20	ロ-ロ	暗茶褐		若干粘性含む。	5.45	30	10	10	10									
8	65.50	7.60	0.90	粘土質ロ-ロ	茶 褐		腐植物・火山灰少量混る。 若干含水多い。	6.15	3	1	2										
9	64.80	8.30	0.70	シルト質細砂	暗茶褐		腐植物・火山灰少量混る。 中砂少量混る。	7.15	4	1	2	1									
10							所々黄色細砂。	7.46	31	10	13	8									
11	63.60	9.50	1.20	シルト混り細砂	淡青黄		所々黄色細砂。	8.15	12	3	4	5									
12							黄色細砂薄く挟む。	8.45	30	10	10	10									
13	62.30	10.80	1.30	粘土質細砂	淡黄褐		所々棒状コアで採取。	9.15	9	2	3	4									
14							中砂・極く少量混る。	9.45	30	10	10	10									
15	61.50	11.60	0.80	砂質シルト			所々粘土質細砂を薄く互層状に挟む。	10.15	9	2	3	4									
16							黄 灰	10.45	30	10	10	10									
17							黄 灰	11.15	9	2	3	4									
18							黄 灰	11.47	32	10	10	12									
19							黄 灰	12.15	19	6	6	7									
20							黄 灰	12.45	30	10	10	10									
21							黄 灰	13.15	13	3	4	6									
22							黄 灰	13.45	30	10	10	10									
23							黄 灰	14.15	12	2	4	6									
24							黄 灰	14.45	30	10	10	10									
25							黄 灰	15.15	22	6	7	9									
26	56.50	16.60	5.00	シルト混り細砂	淡黄褐		所々固結している。	15.45	30	10	10	10									
27							所々固結している。	16.15	21	5	7	9									
28							所々固結している。	16.45	30	10	10	10									
29							所々固結している。	17.15	28	7	9	12									
30	54.80	18.30	1.70	砂混りシルト	暗青灰		微細砂・少量混る。	17.45	30	10	10	10									
31							微細砂・少量混る。	18.15	34	7	10	17									
32							微細砂・少量混る。	18.45	30	10	10	10									
33							微細砂・少量混る。	19.15	48	10	18	20									
34							微細砂・少量混る。	19.45	30	10	10	10									
35	52.50	20.60	2.30	細 砂	茶 褐		所々中砂少量混る。	20.15	50	17	27	6									
36							所々中砂少量混る。	20.36	21	10	10	7									
37							所々中砂少量混る。	21.15	50	24	26										
38							所々中砂少量混る。	21.32	17	10	7										
39							所々中砂少量混る。	22.15	50	31	19										
40							所々中砂少量混る。	22.29	14	10	4										
41							所々中砂少量混る。	22.79	50	31	19										
42							所々中砂少量混る。	23.15	50	17	33										
43							所々中砂少量混る。	23.36	21	20	7										
44	48.90	24.20	3.60	固結シルト	暗 灰		細砂を多量・不規則に混る。	24.15	50	20	30										
45							細砂を多量・不規則に混る。	24.34	19	10	9										
46							細砂を多量・不規則に混る。	25.15	50	20	30										
47	47.74	25.36	1.16	細 砂	暗黄褐		微細砂を極く少量混る。	25.36	21	15	29	6									



備 考：

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- ゼニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- ⊖ その他

# 土 質 柱 状 図

報 告 用 紙


調査名・調査地点 (坂本) 金井中学校地質調査委託

標 高 73.050 m

調査年月日 58年2月27日~58年3月1日

ボーリング孔: No. 17

孔内水位 GL-8.80 m



備 考:

- 試料採取方法の記号
- デュソン型サンプラー
  - シンウォールサンプラー
  - 貫入試験用サンプラー
  - ⊕ ファイルサンプラー
  - × その他